

CARCINOMA DE BASE DE LENGUA. SUPERVIVENCIA GLOBAL A LOS 2 AÑOS.

Dra. Zeila Omar Robert, Dra Laura Elena Hormigó Polo, Dr. Victor Juan Alfonso Querts, Dr. Yorgenis Delfino Moraga, Dr. Rafael Manuel Neyra Barros
Hospital Oncológico Docente "Conrado Benítez García"

Objetivos:


1. Determinar la supervivencia global y por etapas a los 2 años de los pacientes inscritos en el Hospital Oncológico Conrado Benítez en el período enero/2013-Diciembre/2017.
2. Identificar diferencias entre las características de los pacientes vivos y fallecidos.

Diferencias entre los pacientes vivos y fallecidos

- La edad media de los pacientes fallecidos fue mayor, así como el consumo de tabaco,
- los pacientes vivos tuvieron tumores más pequeños, adenopatías más grandes y quísticas, mayor cantidad de niveles afectados, y paradójicamente estadíos clínicos más avanzados.
- La mayor cantidad de pacientes con ganglios mayores que 3cm tenían tumores menores que 2 cm, (42 pacientes, 82,4%)
- Los pacientes vivos tenían tumores menos diferenciados, predominantemente no queratinizados, al contrario de los fallecidos, cuyos tumores eran en su mayoría bien diferenciados y queratinizados.

CONCLUSIÓN: Existieron diferencias clinico-epidemiológicas entre los pacientes vivos y fallecidos, el TNM 7ma edición no es útil para pronóstico, y la tasa de supervivencia a los 2 años fue baja


Gráfico 1. Supervivencia global a los 2 años



72,9%

BAJA TASA DE SV

Gráfico 2. Supervivencia a los 2 años según etapa



I-100%
IV-90,4%

ALTA TASA DE SV EN ETAPA AVANZADA