

Autores:

MSc. Dra. Mariela J. Curbelo Gómez, MSc. Dra. Maria Adela Lull Tombo, MSc. Dra. Marilyn Aroche Quintana, Est. Beatriz Sánchez Curbelo.

Resumen:

Presentamos caso clínico de paciente femenina, de 84 años con una lesión amplia, ulcerada y vascularizada en párpado superior OD, cabeza de la ceja derecha y párpado inferior del OI. Fue intervenida quirúrgicamente con excelentes resultados.



Introducción:

En la actualidad existe una frecuencia de los tumores palpebrales ↑ en los **Adultos Mayores**. Sobre todo por encima de los 70 años, con un 47,22% para los de tipo maligno. El tratamiento de los tumores palpebrales es variado, la elección de la conducta a seguir depende del proceso patológico. La cirugía y la radioterapia parecen ser los métodos más efectivos, pero pueden dejar al paciente con un resultado cosmético y funcional comprometido.

Conclusiones: La prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento eficaz y oportuno de los tumores palpebrales contribuyen a una longevidad satisfactoria.

Presentación de caso: Paciente de 84ª, F, procedencia urbana. Acude a consulta por presentar lesiones a nivel de ambos ojos y la ceja derecha, indoloras con dos meses de evolución.

AL
Examen
físico
ocular



Anexos (OD): lesión amplia ulcerada, vascularizada, con bordes definidos, que involucra la ceja y párpado superior, que altera su anatomía. (OI): Aumento de volumen, con pérdida de anatomía párpado inferior.

Conducta: Excéresis- Biopsia (carcinoma epidermoide palpebral) - reconstrucción.

