

CÁNCER DE LARINGE EN ESTADÍOS INICIALES (I y II). CARACTERIZACIÓN DE ASPECTOS CLÍNICOS, EPIDEMIOLÓGICOS Y RESPUESTA AL TRATAMIENTO.

Autores: MSc. Dr. Alejandro Díaz González, Dr. Luís Miguel Pérez Brito, Dra. Ana Lourdes Vasallo Díaz, Dra. Yaneisy Rodríguez Fernández, Dra. Ayisleydis Corrales Álvarez, Dr. Abranly G. Martínez Pérez.


Introducción

Estudio de serie de casos en 34 pacientes con diagnóstico de cáncer de laringe en estadios iniciales (I y II) en la provincia de Cienfuegos, en el período comprendido entre el 1ro de enero de 2016 al 30 de diciembre de 2018 evaluados en la consulta Multidisciplinaria de Cabeza y Cuello del Hospital Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima en la provincia de Cienfuegos. a los que se les dio seguimiento hasta complementar 12 semanas (hasta 31 de marzo de 2019 como fecha final de recogida de datos).

Resultados

Predominaron los pacientes por encima de los 60 años de edad (67.7%), el sexo masculino aportó mayor número de casos (97%), la mayoría de los pacientes con hábitos tóxicos combinado de fumador-bebedor (55.9%), sobresalieron los pacientes con lesiones en la región glótica (88.2%) y el T₁N₀M₀ fue el que mayor número de casos aportó; predominó la estirpe histológica moderadamente diferenciado (14-41.1%).

TOPOGRAFÍA	RESPUESTA AL TRATAMIENTO	
	Si	No
Glotis (n=30)		
T ₁ N ₀ M ₀ (n=20)	20 (100%)	-
T ₂ N ₀ M ₀ (n=10)	8 (80%)	2 (20%)
Subtotal	28 (93.3%)	2 (6.7%)
Supraglotis (n=4)		
T ₁ N ₀ M ₀ (n=2)	2 (100%)	-
T ₂ N ₀ M ₀ (n=2)	2 (100%)	-
Subtotal	4 (100%)	-
TOTAL (n=34)	32 (94.2)	2 (5.8)



Conclusiones.

Casi la totalidad de los pacientes (94.2%) tuvo respuesta al tratamiento con Radioterapia al concluir las 12 semanas de postratamiento.